Обнаружение вирусных заболеваний лошадей -

Аспекты отбора проб

Обучение лабораторным методам исследования болезней лошадей
29 – 30 ноября 2021 года

Фалько Стейнбэк

Группа вирусологии млекопитающих,
APHA, Вейбридж, Великобритания

Animal &
Plant Health
Agency

Агентство по охране здоровья животных и растений АРНА

#APHAscience

@APHAgovuk

@APHAgov

company/aphagovuk

Краткая история APHA

- 1917** - Открывается Институт Аддлстоуна
- 1922** - Создана Служба ветеринарных расследований (СВР/VIS)
- 1990** - Открыта Центральная ветеринарная лаборатория (ЦВЛ/CVL)
- 1995** – Создано Агентство ветеринарных лабораторий (АВЛ/VLA)
теперь включает «региональные лаборатории»
- 2011** - Создано агентство ANVLA после слияния АВЛ и
агентства по охране агентства здоровья животных
- 2014** – APHA - после слияния ANVLA и FERA

- Специализированные ведомства для:

- Научной работы
- Исследований животных
- Крупномасштабных тестов
- Производство реагентов и продуктов

Вирусология млекопитающих APHA

Обычные и экзотические вирусы

Эндемические вирусы

Лошади имеют собственные заболевания, но также являются переносчиками зоонозных инфекций

- **Вирусные заболевания**

Вирус Западного Нила

Бешенство

Вирус везикулярного стоматита

Вирусы энцефалита лошадей (VEEV, EEE, WEE)

Вирус болезни Борна

Вирусный артериит лошадей (EVA)

Вирус инфекционной анемии лошадей

Грипп лошадей

Ринопневмонит лошадей (EHV-1/-4)

Вирус африканской болезни лошадей

Лошадиная оспа

- **Бактериальные заболевания**

Burkholderia mallei (мыт)

Bacillus anthracis

Taylorella equigenitalis (СЕМ/Контагиозный конский метрит)

- **паразитарные болезни**

Trypanosoma equiperdum (Подседал)

Trypanosoma evansi (Surra); [DD *T. brucei*]

Theileria equi (Пироплазмоз)

Babesia caballi (Пироплазмоз)

Fig 2: Worldwide movements of racehorses between 2001 and 2006. The figure shows the range of the number of movements during that time period, the thickness of the arrows indicate the number of movements in 2006.

Ни одно другое живое животное не путешествует так много и далеко, как лошади.

Fig 3: Movement of horses from Africa, Asia and South America to Europe. The figures and the thickness of the arrows represent the sum of movements during that time period (TRACES data from 2004 to summer 2007, Table 3).

Animal &
Plant Health
Agency

EAV (Вирусный артериит лошадей) 2016-2020

Disease status

- Present
- Suspected
- Absent
- No information

Вирус конского артериита (Nidovirales)

Геномная РНК
положительное направление,
приблиз. 12.7кВ

(B) *Arterivirus*

Связанные с вирусом PPCC/PRRSV

Клиническая картина и регулирование в Великобритании

- Инкубация $\approx$ 7 дней - **без признаков**
- Признаки значительно различаются - больше у старых и молодых
 - Лихорадка
 - **Отек**
 - ноги, грудина, мошонка/молочная железа, челюсть, периорбитальная область
 - кожные бляшки с крапивницей
 - тяжелый двусторонний конъюнктивит и слезотечение
 - Инфекция верхних дыхательных путей
 - Депрессия/анорексия
 - Кожная сыпь, в основном на шее
 - **Аборт**
 - Смерть молодых, старых и животных с ослабленным иммунитетом
- Информация о подозрениях на клинический случай или животных-носителей (жеребцов) доводится до сведения властей

B. DIAGNOSTIC TECHNIQUES

Table 1. Test methods available for the diagnosis of equine viral arteritis and their purpose

Method	Purpose					
	Population freedom from infection	Individual animal freedom from infection	Efficiency of eradication policies	Confirmation of clinical cases	Prevalence of infection - surveillance	Immune status in individual animals or populations post-vaccination
Virus isolation	-	+++	-	+++	-	-
Agar gel immunodiffusion	-	-	-	-	-	-
Complement fixation	-	-	-	+++	-	-
Enzyme-linked immunosorbent assay	+	++	+	++	+++	+
Polymerase chain reaction	-	+++	-	+++	-	-
Virus neutralisation	+	+++	+	+++	+++	+++

Key **+++ = recommended method**; ++ = suitable method; + = may be used in some situations, but cost, reliability, or other factors severely limits its application; - = not appropriate for this purpose.

Although not all of the tests listed as category +++ or ++ have undergone formal standardisation and validation, their routine nature and the fact that they have been used widely without dubious results, makes them acceptable.

Руководство по наземным животным

Методы, применяемые для исследований EVA

Выделение вируса (RK-13)

Великобритания 2011 (62)

- Ввезен из континента примерно ~ 3 года назад
- Протестирован до разведения
 - SNT 1:4096
- VI отрицательный
- PCR/qPCR положительный
 - ORF 1; -5; -7

- анализ спермы на наличие nAbs
 - Включает инактивацию (вируса) и отрицательную контрольную сперму для удаления из-за ингибирующих факторов

nAbs в сперме - не уникальное явление

Лошадь	Сыворотка VN-титр	Сперма VN-титр
1715	>2048	64
No2 2010	3072	32
62/167	4096	256

ORF5

Steinbach F, et al. (2015)
 Virus research, **202**: 144-150
doi.org/10.1016/j.virusres.2014.12.009

Animal &
Plant Health
Agency

EIA (инфекционная анемия лошадей) 2016-2020

Disease status

■ Present

■ Suspected

■ Absent

■ No information

Заболевание:

- **Инфекционное и потенциально смертельное (только для лошадей) вирусное заболевание **для лошадиных** (лошади, ослы, мулы).**
- **Повышенная распространенность в теплой влажной среде.**
- **Торранс (Канада) ввел термин «болотная лихорадка» в 1903 г.**
- **Острые, хронические и скрытые формы**

Баки - 35-летний (2006 г.) мерин с положительной реакцией на инфекционную анемию лошадей (EIA), который с 1984 года живет на ферме Малден-Брук в Уэст-Бойлстоне, штат Массачусетс.

Animal &
Plant Health
Agency

Результаты вскрытия

Пример из Германии, 2006 г.

Лабораторные тесты

- Тест **Коггинса** - старый, безопасный, запоздалый, отнимающий много времени
- **ИФА** - некоторые валидированы
- **Вестерн-блот** - необходимое дополнение
- **ПЦР** - интересная проблема

КОГГИНС

контрольный

случай

Иммуноферментный анализ (ELISA):

- Несколько ИФА в настоящее время одобрены различными национальными органами США и Европы и доступны на международном уровне. Например:
 - ❖ Конкурентный ИФА и неконкурентный anti-p26 Abs.
 - ❖ В другом неконкурентном ИФА используются антигены p26 core и gp45 (вирусный трансмембранный белок).
- Положительный результат ИФА должен быть подтвержден с помощью теста AGID поскольку были отмечены отдельные ложноположительные результаты при использовании ИФА.
- При наличии расхождений между двумя методами результаты также могут быть подтверждены методом иммуноблота

Иммуноблот

Генетическое разнообразие

Последовательности gag штаммов EIAV

Долгосрочные не прогрессирующие (LTNPs) ВИЧ

Виремические контроллеры имеют низкую, но легко измеряемую вирусную нагрузку

Элитные контроллеры подавляют до крайне низких уровней

Уровень обнаружения должен быть очень низким

Animal &
Plant Health
Agency

EHV-1 (вирус конского герпеса) 2016-2020

Нейротропная инфекция ЕНУ-1

Миелэнцефалопатия вируса герпеса лошадей

Тяжесть клинических признаков различна

инкоординация задних конечностей до квадриплегии - паралича

- задержка мочи и кала
- потеря чувствительности в области промежности и хвоста

Чоудхури и др., 1986 г.

Вызванные герпесвирусом лошади типа 1 (ЕНУ-1) аборт и параличи на племенной ферме липицанеров. Событие, которое угрожало гибелью разведению липицанеров в Австрии (1983)

30 случаев абортов и перинатальной смертности на племенной ферме липицанеров в Австрии 10 кобыл умерли после того, как у них проявились нарушения центральной нервной системы, атаксия и паралич

2007:

ВИРУС ГЕРПЕСА ЛОШАДЕЙ (ВГЛ) УБИВАЕТ 40 ЛУЧШИХ ПОЛО-ПОНИ В НИГЕРИИ!

2021

Вспышка ЕНУ-1 на соревнованиях по конкуру в Испании унесла жизни нескольких животных и нарушила календарь соревнований Международной федерации конного спорта (FEI)

В ряде публикаций было высказано предположение, что одноточечная мутация в ДНК-полимеразе (ORF30) герпесвируса лошадей 1 (EHV-1) определяет **нейровирулентность**

Nugent et al., Журнал вирусологии, апрель 2006, стр. 4047–4060

*Анализ вариаций штаммов герпесвируса лошадей 1 выявил **точечную мутацию ДНК-полимеразы, тесно связанную со вспышками нейропатогенных и ненейропатогенных заболеваний***

Гипотеза: Было высказано предположение, что в поле циркулируют **различные штаммы EHV-1, отличающиеся по патогенной способности**. Для изучения этой гипотезы необходимо было выявить генетические маркеры, позволяющие идентифицировать подгруппы родственных штаммов

Результаты Результаты показывают [А] существование нескольких основных генетических подгрупп EHV-1, что соответствует предположению о циркуляции различных штаммов EHV-1 в полевых условиях. . [Б] что некоторые группы штаммов географически ограничены, и их выделяют преимущественно из Северной Америки или Европы.

[В] вариации одной аминокислоты ДНК-полимеразы сильно связаны со вспышками неврологических и не неврологических заболеваний.

28

Дополнительные отчеты

USDA-APHIS (2007) Миелоэнцефалопатия вируса герпеса лошадей: Потенциально новая болезнь http://www.aphis.usda.gov/vs/ceah/cei/taf/emergingdiseasenotice_files/ehv.pdf. Accessed 21 Jan 2008

Гудман, Л. Б., А. Лорегиан, Г. А. Перкинс, Дж. Нуджент, Э. Л. Баклс, Б. Меркорелли, Дж. Х. Кайдд, Г. Палу, К. К. Смит, Н. Остерридер и Н. Дэвис-Пойнтер. 2007.

Точечная мутация в полимеразе герпесвируса определяет нейрпатогенность.
PLoS Pathog 3:e160

авторское резюме

В нашем докладе представлены доказательства **прямой причинно-следственной связи между генотипом штаммов EHV-1 и их нейровирулентностью**, и тем самым дано **должданное объяснение** загадки **различных клинических исходов** после инфекции EHV-1. **Мы доказали, что изменение одной аминокислоты в ключевом вирусном ферменте, ДНК-полимеразе, которая сохраняется у всех герпесвирусов, делает вирус неспособным вызывать неврологическое заболевание.**

ПРОБЛЕМА: наблюдаемые клинические признаки были очень слабыми.....

Goodman et al.

Table 1. Neurologic Grades, CSF Cytology, and qPCR

N=8 per group !

Animal ID	Group	Days Postinfection	Neurologic Grade	CSF Color	Nucleated Cells/ µl CSF	Differential Cell Count	CSF Total Protein (mg/dl)	CSF Viral Genome Copies/ml
Reference ^a	N/A	N/A	N/A	Clear	<6	No abnormalities	<100	0
4	D	7	2	Clear	5	75% lymphocytes; 25% macrophages	45	174
4	D	16	2	Yellow	56 LS; 24 AO	AO: 86% lymphocytes; 14% macrophages	215 LS; 139 AO	2,821 LS; 9,450 AO
9	D	16	1	Clear	2	53% macrophages; 47% lymphocytes	67	<5
42	D	9	0	Clear	0	No abnormalities	20	<5
228	D	7	0	Clear	9	80% small lymphocytes; 20% macrophages; few red blood cells	50	168
120	N	15	0	Clear	1	No abnormalities	67	<5
263	N	15	0	Clear	9	70% lymphocytes; 29% macrophages; 1% neutrophils	73	100
263	N	19	0	Light yellow	13	LS: 52% lymphocytes; 40% macrophages; 8% neutrophils	233	120 LS; <5 AO

Xanthochromia, elevated nucleated cell count, and elevated protein levels are typical (but not specific) for EHV-1 myeloencephalopathy [38]. Samples were collected from the lumbosacral (LS) space in the standing horse, and additional postmortem samples were collected from the atlantooccipital (AO) space. The four veterinarian reviewers' consensus hind limb neurologic grades are reported according to the scale from Mayhew et al. [39], with a grade 2 representing moderate pelvic limb signs, grade 1 representing mild signs, and grade 0 within normal limits. Grades for horses not listed in this table were zero.

* Ab4 не вызывает неврологических симптомов

Chong & Duffus 1992 1/4 животных с легкими неврологическими симптомами (SPF)

Lunn et al., 1991 etc SPF жеребята без неврологических симптомов

Sutton G, Normand C, Carnet F, Couroucé A, Garvey M, Castagnet S, et al.

Вариант вируса герпеса лошадей и новый маркер для эпидемиологического надзора, Европа, 2021. Возникновение инфекционных заболеваний. 2021;27(10):2738-2739.

<https://doi.org/10.3201/eid2710.210704>

Последующее заявление о «консенсусе»

Table 1. Key question about D/N₇₅₂ strains

Is there a particular EHV-1 strain that causes neurological disease?	No DNA _{pol} (ORF30) variants carrying the D ₇₅₂ marker are associated with most neurological disease outbreaks
Are all outbreaks of neurological disease caused by D ₇₅₂ viruses?	No D ₇₅₂ viruses are more commonly isolated from horses that suffered from neurological disease than N ₇₅₂
Are N ₇₅₂ viruses nonpathogenic?	No N ₇₅₂ viruses are isolated from the majority of abortion outbreaks and a minority of neurological disease outbreaks worldwide
What proportion of horses carry D ₇₅₂ viruses?	Not known Available data suggest that 5–20% of EHV-1 viruses have the D ₇₅₂ genotype, but this data has been generated from a small number of studies
Is D/N ₇₅₂ testing useful?	Debatable Knowing the D/N ₇₅₂ genotype of an EHV-1 isolate is not relevant to the prevention and control of EHV-1 abortion outbreaks If an EHV-1 outbreak is associated with neurological signs, strict disease control measures should be imposed regardless of D/N ₇₅₂ genotype If an active EHV-1 infection, as evidenced by viremia and/or shedding, is diagnosed as D ₇₅₂ positive, even in the absence of neurological signs, it is possible that there could be an increased risk of a neurological disease outbreak. However, no study to date has properly tested this relationship The most important reason to perform this testing is to increase our knowledge about EHV-1 epidemiology

J Vet Intern Med 2009;23:450–461

Выводы

- Предыдущее исследование генотипов EHV-1 описало вариации штаммов и выявило точечную мутацию в ORF 30, которая была связана с анамнестическим сообщением о неврологических симптомах
- **Кредо: существует (скорее всего) прямая зависимость между патогенностью штаммов, количеством вызванных абортс и появлением неврологических симптомов**
- *“Результаты наших экспериментальных исследований инфекции показывают, что вариант последовательности N752 ДНК Pol EHV-1, по сравнению с вариантом D752, имеет сниженный **общий патогенный потенциал** и способность вызывать неврологические признаки.”*
- Вариант D752, вероятно, был на подъеме.
- **Однако в настоящее время анализ мутации ORF30, по-видимому, имеет ограниченную диагностическую ценность, поскольку она описывает только потенциальную возможность**
- **Нельзя не дооценивать влияние факторов хозяина !**

Animal &
Plant Health
Agency

EIV (вирус конского гриппа) 2016-2020

Структура

- Сегментированный геном РНК с отрицательной цепью
- 8 сегментов гена, 10 генов
- На поверхности находятся два гликопротеина гемагглютинин (HA) и нейраминидаза (NA).
- Два матриксных белка
- Два неструктурных белка
- Три белка, входящие в состав РНК-полимеразы
- Нуцелопротейн

Филогенетическое дерево по гриппу лошадей H3N8 с 1963 года по настоящее время

- Вирусы гриппа лошадей относятся к подтипам H7N7 и H3N8, в настоящее время циркулируют вирусы H3N8
- В конце 1980-х годов последовательности гемагглютинина вируса разошлись на две отдельные ветви - американскую и европейскую сублинии.
- Американская ветвь подразделяется далее, образуя "вариант американской" подлинии, и большинство вирусов, циркулирующих в Великобритании, принадлежат к этой ветви. Они несколько отличаются от тех, что встречаются в Северной Америке, которые также относятся к этой ветви.

Передача

- Болезнь распространяется очень быстро (24-72 часа) среди восприимчивых лошадей, находящихся в контакте, вызывая высокую заболеваемость.
- Передаче гриппа часто способствует сочетание вакцин, **успешно ослабляющих клинические признаки, но не предотвращающих выделение вирусов.**
 - Может быть связано с изменением потенции вакцины
 - Плохая реакция на прививку
 - Антигенный дрейф или сочетание этих факторов
 - Лошадиный грипп имеет большое значение для международного перемещения лошадей и включен в список регистрируемых заболеваний МЭБ.

Disease	Risk of undetected presence in the subpopulation	Risk of introduction into the subpopulation	Risk of transmission within and from subpopulation
EI	Yes* (Subclinical infection in partially immune horses)	Yes (Effective airborne transmission, risk increased during air transportation)	Yes (Pre-symptomatic shedding ; asymptomatic shedding in partially immune horses ; air-borne transmission not excluded within the subpopulation)

Диагностические тесты - RT-qPCR

- *Антиген в носовых выделениях может быть обнаружен непосредственно с помощью иммуноферментного анализа с захватом антигена (ELISA) с использованием моноклонального антитела против нуклеопротеина. (Cook et al., 1988; Livesay et al., 1993).*
- Анализ ПЦР в реальном времени для обнаружения матричного гена был описан Spackman et al. 2002.
- Протестирован на выявление всех 16 типов HA и NA.
- Проверили чувствительность и специфичность в отношении VI и NI, которые оказались сопоставимыми.
- Этот метод используется во многих лабораториях, включая APHA, для выявления гриппа

Диагностические тесты - выделение вируса

- Традиционно лошадиный грипп диагностируется путем выделения вируса из носоглоточных мазков в развивающихся куриных эмбрионах
- Бывший "золотой стандарт" МЭБ:
- но для достижения результата может потребоваться до нескольких дней
- Необходимы последующие действия через, например, НИ

Диагностические тесты - на основе гемагглютинации

- Тест на ингибирование гемагглютинации (НИ) и основан на распознавании вируса панелью эталонных антител.
- Вирусы гриппа связываются с эритроцитами с помощью молекулы гемагглютинина и агглютинируют их. Этот процесс легко наблюдать, если смешать вирус и эритроциты в правильных пропорциях и высеять в 96-луночный планшет.
- Путем последовательного разведения специфических антител и добавления их к вирусу можно блокировать это взаимодействие и измерить, насколько тесно вирус связан с антисыворотками и предыдущими штаммами.
- На диаграмме ниже верхний ряд лунок показывает сильное взаимодействие между вирусом и антисывороткой (титр = 256), нижний ряд - слабое взаимодействие (титр = 4).

Animal &
Plant Health
Agency

Asiantaeth
Iechyd Anifeiliaid
a Phlanhigion

Выражение благодарности:

Defra **SV3300**

APHA **Отдел вирусологии, ASU**

OGL

© Crown copyright 2021

Эта информация лицензирована в соответствии с Open Government Licence v3.0.

Чтобы ознакомиться с этой лицензией, посетите www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/

Все запросы, касающиеся данной публикации, следует направлять по адресу : [falko.steinbach@APHA.gov.uk]

#APHAScience

@APHAgovuk

@APHAgov

company/aphagovuk